

FORMULARIO DE VARIACION INTER-OBSERVADOR DEL ERCE

A. Examinador		Paciente No.	
B. Visión Usando los anteojos de distancia No usa: O (1) Usa: O (2) Usando los anteojos de lectura No usa: O (1) Usa: O (2)		C. Examen cristalino Cristalino normal / opacidad mínima O (1) OI O (1) Opacidad evidente O (2) O (2) Ausencia cristalino (afaquia) O (3) O (3) Pseudofaquia sin OCP O (4) O (4) Pseudofaquia con OCP O (5) O (5) No valorable (ej: opacidad de córnea) O (6) O (6)	
Como se presenta Si ve 0.5 O (1) OI O (1) Baja visión No ve 0.5, ve 1.0 O (2) O (2) No ve 1.0, ve 1.3 O (3) O (3) Ciego No ve 1.3, ve 1.8 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)		D. Causa principal de visión >0.5 como se presenta (marque solo una opción para cada ojo) OD OI Error refractivo O (1) O (1) Causa principal de persona O (1) Afaquia no corregida O (2) O (2) O (2) Catarata, sin tratamiento O (3) O (3) O (3) Complicaciones quirúrgicas O (4) O (4) O (4) Tracoma, opacidad corneales O (5) O (5) O (5) Otras opacidades corneales O (6) O (6) O (6) Ptisis O (7) O (7) O (7) Oncocercosis O (8) O (8) O (8) Glaucoma O (9) O (9) O (9) Retinopatía diabética O (10) O (10) O (10) Degeneración macular senil O (11) O (11) O (11) Otras segmento posterior O (12) O (12) O (12) Anormalidades del globo/SNC O (13) O (13) O (13) No examinación: si ve ≤0.5 O (14) O (14) O (14)	
Con estenopeico Si ve 0.5 O (1) OI O (1) Baja visión No ve 0.5, ve 1.0 O (2) O (2) No ve 1.0, ve 1.3 O (3) O (3) Ciego No ve 1.3, ve 1.8 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)			

FORMULARIO DE VARIACION INTER-OBSERVADOR DEL ERCE

A. Examinador		Paciente No.	
B. Visión Usando los anteojos de distancia No usa: O (1) Usa: O (2) Usando los anteojos de lectura No usa: O (1) Usa: O (2)		C. Examen cristalino Cristalino normal / opacidad mínima O (1) OI O (1) Opacidad evidente O (2) O (2) Ausencia cristalino (afaquia) O (3) O (3) Pseudofaquia sin OCP O (4) O (4) Pseudofaquia con OCP O (5) O (5) No valorable (ej: opacidad de córnea) O (6) O (6)	
Como se presenta Si ve 0.5 O (1) OI O (1) Baja visión No ve 0.5, ve 1.0 O (2) O (2) No ve 1.0, ve 1.3 O (3) O (3) Ciego No ve 1.3, ve 1.8 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)		D. Causa principal de visión >0.5 como se presenta (marque solo una opción para cada ojo) OD OI Error refractivo O (1) O (1) Causa principal de persona O (1) Afaquia no corregida O (2) O (2) O (2) Catarata, sin tratamiento O (3) O (3) O (3) Complicaciones quirúrgicas O (4) O (4) O (4) Tracoma, opacidad corneales O (5) O (5) O (5) Otras opacidades corneales O (6) O (6) O (6) Ptisis O (7) O (7) O (7) Oncocercosis O (8) O (8) O (8) Glaucoma O (9) O (9) O (9) Retinopatía diabética O (10) O (10) O (10) Degeneración macular senil O (11) O (11) O (11) Otras segmento posterior O (12) O (12) O (12) Anormalidades del globo/SNC O (13) O (13) O (13) No examinación: si ve ≤0.5 O (14) O (14) O (14)	
Con estenopeico Si ve 0.5 O (1) OI O (1) Baja visión No ve 0.5, ve 1.0 O (2) O (2) No ve 1.0, ve 1.3 O (3) O (3) Ciego No ve 1.3, ve 1.8 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)			