

FORMULARIO DE VARIACION INTER-OBSERVADOR DEL ERCE				
A. Examinador		Paciente No.		
B. Visión Usando los anteojos de distancia No usa: O (1) Usa: O (2) Usando los anteojos de lectura No usa: O (1) Usa: O (2)		C. Examen cristalino Cristalino normal / opacidad mínima O (1) Opacidad evidente O (2) Ausencia cristalino (afaquia) O (3) Pseudofaquia sin OCP O (4) Pseudofaquia con OCP O (5) No valorable (ej: opacidad de córnea) O (6)		OD OI
Como se presenta Si ve 20/60 O (1) O (1)				
Baja visión No ve 20/60, ve 20/200 O (2) O (2) No ve 20/200, ve 20/400 O (3) O (3)				
Ciego No ve 20/400, ve 20/1200 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)				
Con estenopeico Si ve 20/60 O (1) O (1)				
Baja visión No ve 20/60, ve 20/200 O (2) O (2) No ve 20/200, ve 20/400 O (3) O (3)				
Ciego No ve 20/400, ve 20/1200 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)				
		D. Causa principal de visión <20/60 como se presenta (marque solo una opción para cada ojo) OD OI		Causa principal de persona
		Error refractivo O (1) O (1) Afaquia no corregida O (2) O (2) Catarata, sin tratamiento O (3) O (3) Complicaciones quirúrgicas O (4) O (4) Tracoma, opacidad corneales O (5) O (5) Otras opacidades corneales O (6) O (6) Ptisis O (7) O (7) Oncocercosis O (8) O (8) Glaucoma O (9) O (9) Retinopatía diabética O (10) O (10) Degeneración macular senil O (11) O (11) Otras segmento posterior O (12) O (12) Anormalidades del globo/SNC O (13) O (13) No examinación: si ve 20/60 O (14) O (14)		O (1) O (2) O (3) O (4) O (5) O (6) O (7) O (8) O (9) O (10) O (11) O (12) O (13) O (14)

FORMULARIO DE VARIACION INTER-OBSERVADOR DEL ERCE				
A. Examinador		Paciente No.		
B. Visión Usando los anteojos de distancia No usa: O (1) Usa: O (2) Usando los anteojos de lectura No usa: O (1) Usa: O (2)		C. Examen cristalino Cristalino normal / opacidad mínima O (1) Opacidad evidente O (2) Ausencia cristalino (afaquia) O (3) Pseudofaquia sin OCP O (4) Pseudofaquia con OCP O (5) No valorable (ej: opacidad de córnea) O (6)		OD OI
Como se presenta Si ve 20/60 O (1) O (1)				
Baja visión No ve 20/60, ve 20/200 O (2) O (2) No ve 20/200, ve 20/400 O (3) O (3)				
Ciego No ve 20/400, ve 20/1200 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)				
Con estenopeico Si ve 20/60 O (1) O (1)				
Baja visión No ve 20/60, ve 20/200 O (2) O (2) No ve 20/200, ve 20/400 O (3) O (3)				
Ciego No ve 20/400, ve 20/1200 O (4) O (4) PL+ O (5) O (5) NPL O (6) O (6)				
		D. Causa principal de visión <20/60 como se presenta (marque solo una opción para cada ojo) OD OI		Causa principal de persona
		Error refractivo O (1) O (1) Afaquia no corregida O (2) O (2) Catarata, sin tratamiento O (3) O (3) Complicaciones quirúrgicas O (4) O (4) Tracoma, opacidad corneales O (5) O (5) Otras opacidades corneales O (6) O (6) Ptisis O (7) O (7) Oncocercosis O (8) O (8) Glaucoma O (9) O (9) Retinopatía diabética O (10) O (10) Degeneración macular senil O (11) O (11) Otras segmento posterior O (12) O (12) Anormalidades del globo/SNC O (13) O (13) No examinación: si ve 20/60 O (14) O (14)		O (1) O (2) O (3) O (4) O (5) O (6) O (7) O (8) O (9) O (10) O (11) O (12) O (13) O (14)