

DIABETES Y RETINOPATÍA DIABÉTICA

H. Evaluación de diabetes (completado para todos)

- 1 ¿Alguna vez un médico o enfermera le dijo que tiene diabetes, azúcar en la orina o altos niveles de azúcar en la sangre? No: ☐ (1)
Si: ☐ (2)
- 2 Acción: Hacer medición de glucemia sanguínea mg/dL 3 Rehusó prueba de sangre ☐

I. Preguntas para los diabéticos conocidos (respondió 'Sí' a la pregunta H1)

- 4 ¿Qué edad tenía cuando se le decía que tenía diabetes? Años
- 5 ¿Actualmente recibe algún tratamiento para diabetes? No: Sin tratamiento ☐ (1)
Si: Dieta solo ☐ (2)
Pastillas ☐ (3)
Insulina ☐ (4)
Pastillas y insulina ☐ (5)
Otro ☐ (6)
- 6 Antes de hoy ¿le han examinado sus ojos por causa de su diabetes, p. ej., se administro gotas a sus ojos antes de la inspección, o sacaba una foto del fondo de su ojo? No: No examinado ☐ (1)
Si: Hace 0-12 meses ☐ (2)
Hace 13-24 meses ☐ (3)
Hace >24 meses ☐ (4)
- Si responde 'Sí', ¿Cuándo fue la última vez que examinaron sus ojos por causa de la diabetes?

J. Evaluación de la retinopatía diabética

Completar para los diabéticos conocidos: 'Sí' a pregunta H1 y/o para glucosa ≥ 200 mg/dL

- 7 Método de la inspección: Dilatación y oftalmoscopia ☐ (1)
Cámara de fondo de ojo ☐ (2)
Rehusó dilatación o fotografía de fondo ☐ (3)

8 Retinopatía

OD

OI

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| R0 (sin retinopatía visible) | <input type="radio"/> (1) | <input type="radio"/> (1) |
| R1 (leve)* | <input type="radio"/> (2) | <input type="radio"/> (2) |
| R2 (visible, de fondo)* | <input type="radio"/> (3) | <input type="radio"/> (3) |
| R3 (derivable)* | <input type="radio"/> (4) | <input type="radio"/> (4) |
| R4 (proliferativa)* | <input type="radio"/> (5) | <input type="radio"/> (5) |
| R6 (no suficientemente visible)* | <input type="radio"/> (6) | <input type="radio"/> (6) |
- Motivo por no ser suficientemente visible
-

9 Maculopatía

OD

OI

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| M0 (sin maculopatía) | <input type="radio"/> (1) | <input type="radio"/> (1) |
| M1 (visible)* | <input type="radio"/> (2) | <input type="radio"/> (2) |
| M2 (derivable)* | <input type="radio"/> (3) | <input type="radio"/> (3) |
| M6 (no suficientemente visible)* | <input type="radio"/> (4) | <input type="radio"/> (4) |

10 Cicatrices de fotocoagulación con láser

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ausencia de cicatrices de láser | <input type="radio"/> (1) | <input type="radio"/> (1) |
| Presencia de cicatrices – láser panretiniana | <input type="radio"/> (2) | <input type="radio"/> (2) |
| Presencia de cicatrices – láser macular | <input type="radio"/> (3) | <input type="radio"/> (3) |
| Presencia de cicatrices – láser panretiniana y macular | <input type="radio"/> (4) | <input type="radio"/> (4) |

*Derivar en caso de diabetes sin control o nuevo diagnóstico.

*Derivar por cualquier signo de retinopatía o si no se visualiza (R1-6/M1-M6)